

על קבוצת קיקסית הקבוקנות

מאת: אבי שמידע


מה בין קיקסיה לשתנית?

הסוג קיקסיה (Kickxia) הופרד מהסוג שתנית בעיקר על פי סימן אופן פתיחת הלקט: בשתנית נפתח הלקט על-ידי 4-6 מכנים דמוויים שבתוכם הממוקמים בחלק העליון של הלקט. בסוג קיקסיה, לעומת זאת, נפתח הלקט על-ידי חריצי אוורך המתפתחים ביוויאתו. כל המיניות בסוג שתנית הם חד-שנתיים, ואילו מיני הסוג קיקסיה רובם רב-שנתיים, למעט קבוצת קיקסיה הקבוקנות, שהיא חד-שנתית.

יש לציין שההפרדה בין הסוגים קיקסיה לשנתנית איננה ברורה ויש מינים המראים סימני ביניהם; לכן יש חוקרים הנוטים לאחד אותם לסוג מסווף - שתנית, כמו שהיה קלים ב'מגדריך לצמחי ארץ-ישראל' הישן. אולם בשנים האחרונות נוהגים רוב החוקרים לחת מעמד עצמאי לשני הסוגים - קיקסיה ושנתנית. יזכיר כי השם קיקסיה הוא לטיני, ויש למצואו לסוג זה שם עברי ("בת שנתנית"), לפי הצבעו של פרופ' מ. זהרוי.



310. Kickxia sp. (L.) Dumort. קיקסיה עטלה-שניט



311. Kickxia lanigera (Ded.) Hand.-Mazz. קיקסיה פסיפה

קבוצת קיקסית הקבוקנוט

זו קבוצה מינימלית בסוג **קיקסית** הinclusive מינים חד-שנתים האופייניים בעיקר לשדות, מעズבות וצד ידרכים. כל המינים שרוועים ומתקבלים על פני הקרקע, והם גדלים ופורחים בעיקר באביב המאוחר ובקיץ. כדי קל להכירם ולהבדילם משאר מיני הסוג פשנתנית (בן המינים חזקופים) או מהמינים האחרים בסוג קיקסית, שהם רב-שנתים מעורצים. על קבוצה זו נמנים: **קיקסית צמירה**, **קיקסית הקבוקנוט**, **קיקסית עגולה עליים** ו**קיקסית שרואה**.

כיצד מבילים בין מיני הקבוצה? **קיקסית הצמירה** היא מין נדיר מאוד שנמצא עד כה רק באדמות מעובדות מזורח ליט המלה. היא דומה **קיקסית עגולה עליים** ונבדלת ממנה רק באונות הגביע הצרות. מין זה מופיע רק בפלורה פלשניתה, ולא נמצא עד כה ממערב לירדן. פרופ' זהרי לא כלל אותו במגדיר החדש.

שני המינים הנפוצים מטור קבוצה זו בארץ הם ק. **קבוקנוט** וק. **עגולה עליים**. ק. **עגולה עליים** ניכרת בעליה העגולים והרחבים ובכורתה הצהובה עם כתם חום עמוק בשפתה העליונה. מין זה נפוץ בעיקר בשדות עצובים עם אדמה עמויה. ללא תחרות יכולות הצמחים להתפשט ולהציגו לקוטר גדול של 1-4 מ'.

המין השני - ק. **קבוקנוט** (השם על פי הפלורה) נקרא במגדיר היישן וכן במגדיר החדש בשם ק. **מגובשת**. פרופ' פינברון אשר עבד על הסוג בפלורה, מצאה כי הטקסון * בנייל בהוגדר לפנים בארץ בטמות כ- K. commutatacirrhosa ובהאמת לכך שינה (לצערנו, כיוון שהוא ממיליצים לא לשנות שמות עבריות) פרופ' פינברון למין זה גם את שמו העברי **פשנתנית מגובשת** (מגדיר ישן) לשנתנית **קבוקנוט**.

פרופ' זהרי במגדיר החדש קיבל את ההגדירה הנכונה של שם הלטיני, אך השאיר את השם העברי היישן.


אילו תוכנות אופייניות לקבוצת הקבוקנוט?

למן זה עוקצי פרחים נימיים וארוכים מאוד (וואולי בשל כך נקרא תמין ק. **קבוקנוט**). גם ק. **קבוקנוט**, כק. **עגולה עליים**, הוא צמח מעזבות ושדות, אולם הוא מצוי גם בחורש פטוח וכתבות. במגדיר החדש בכתב בטמות כי זהו מין נדיר וארוחת מabortiva רת'ים העירו לנו על כר.

אורי אליאב מתרת צבי מדוח על צמחים ענקיים (בקוטר עד 4 מ') הגדלים ליד מעבות מים ובתווך מים רימונטיים שעיבודו החלק בלבד. בפלורה מצויין כי הצמח חד-שנתי ובמגדיר חדש נקבע חיש או ריש, כלומר ישנים פרטים באוכלוסייה המתעצים וחילם יותר משנה אחת.

* טקסון (taxon) – דרג טקסonomic, כגון מין, סוג, משפחה וכו'.

אנו מבקשים מחובבי הטבע לבדוק נושא זה ביסודות ולראות האט אכן הצמחים (או רק חלק מהאוכלוטיה) עורבים את הסמיון והחזרה ומתחדשים בשנה הבאה.



קלסיה שרועה

על פי המגדיר והפלורה גדול בארץ מין בסוף המשתייך לקבוצת קיקטיית הכנוקנות והוא ק. שרועה. מין זה קרובה מאוד ל-ק. הכנוקנות ונבדל ממנה בעוקציו הפרוחים השעירים או מקריחים, במידה הגבשו של הזרעים ובשכיחות העלים דמיין רומח (בק. שרועה יותר עליים שלמים שכמעט אינם בעלי אובנות דמיין רומח).

כל הסימנים הללו הם כמותיים בלבד ומרמזים על האפשרות שבארץ ישנים מעברים בין שני המינים ואולי אפילו לפנינו מין אחד בלבד. כותב שורות אלו ונציגי רתים עדים לא חלicho לאסוף ולהגדיר מין זה, על אף שהוא נושא כמוין מצוי באדמות הכבdots של רוב הארץ הים-תיכוני.

אנו פוננים לחובבי הטבע לבדוק ביסודות את קבוצת המינים הזאת ולראות האט בארץ לפנינו מין אחד ואריabiili שעליו מותנים ועוקציו הפרוחים שעירים לעיתים, או שנוי מיניות נפרדים. כמו תמיד אנו מדגישים שرك הסתכלותכם בשדה תביא לבירור הבעיה. יש לרשום האט הסימנים המזוכרים לעיל מותנים בתוך כל אוכלוסייה או ביון אוכלוסיות קרובות או לשנה אייזו מגמת השתנות עם גורם טביבתו כמו מסלע, משקעים או רום.